

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO PRAWIDŁOWEGO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU LUB POBRANIA PRÓBKI MOCZU NA POSIEW

1. Prawidłową próbką moczu do badania ogólnego jest pierwsza poranna próbka oddana bezpośrednio po spoczynku nocnym (minimum 4 godzinnym gromadzeniu się moczu w pęcherzu).
2. Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem zewnętrznych narządów moczowo- płciowych przy pomocy wody i mydła, bez wycierania (unikać należy środków odkażających).
3. Mocz pobieramy do jednorazowych naczynek opisanych imieniem i nazwiskiem (w przypadku moczu na posiew mocz pobieramy do naczynek STERYLNYCH).
4. Mocz należy pobrać ze środkowego strumienia tj. po odrzuceniu pierwszej porcji, kolejną (w ilości 50 – 100 ml) zebrać do jednorazowego naczynia, resztę odrzucić.
5. Naczynie szczelnie zamknąć i zabezpieczyć przed wylaniem.
6. Materiał przekazany musi być do laboratorium w jak najkrótszym czasie od momentu pobrania. Jeżeli nie można moczu dostarczyć w krótkim czasie – należy przechowywać go w chłodnym miejscu

U niemowląt i małych dzieci mocz do badania ogólnego można pobierać do specjalnych woreczków. Po pobraniu należy je zabezpieczyć przed rozlaniem – np. włożyć woreczek do jednorazowego pojemniczka i tak dostarczyć do laboratorium.